

Кормовой концентрат GROSTART – NO DIAR

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

GROSTART – NO DIAR (далее – кормовой концентрат) - представляет собой водорастворимый порошок, содержащий декстрозу, микроэлементы (натрий, калий, магний, хлор), лактозу, сухую молочную сыворотку, клетчатку, электролиты, янтарную кислоту, хелатный цинк, Влажность - 13%, сырой протеин - 6,9%, сырая зола - 15,3%, натрий - 6,4%, калий - 1,7%, хлор - 5,2%. Выпускают в упаковках (пластиковых ведрах) по 2,5 кг с мерным стаканом на 50 г порошка.

Не содержит антибиотики и искусственные стимуляторы роста.

Кормовой концентрат гидрофобен на 99,6% - наличие натрия и калия предотвращает потерю жидкости в организме и ацидоз. Выводит из организма токсические вещества. Концентрат совместим с любым медикаментозным лечением, и используется как средство монотерапии. Не изменяет количественный и качественный состав нормальной микрофлоры кишечника, адсорбирует вирусы, бактерии, их токсины, ионы водорода, кишечные газы. Декстроза обеспечивает организм хорошими источниками энергии. Концентрат в течение 24 часов останавливает диарею и обеспечивает защиту бактерий, отвечающих за нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.

ПОКАЗАНИЯ

Для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний с синдромом диареи, а также с целью профилактики болезней органов пищеварения у телят стимуляции роста и развития молодняка сельскохозяйственных животных.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Начинают использовать при первых же признаках нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта.

С *лечебной целью* концентрат назначают сразу после появления первых признаков нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта.

Лечение при слабых признаках диареи: 2-3 дня – 50 грамм концентрата (при использовании мерного стаканчика – набирать до отметки) разводят в 2 л теплой воды. Полученная жидкость по консистенции должна напоминать кисель. Выпаивают дважды в день по 2 литра на прием.

Лечение сильной диареи: 1-3 день – 100 грамм концентрата на 2 л воды, дважды в день. Допускается дача до четырех раз в день в зависимости от тяжести заболевания. На 4-5 день – 50 грамм на 2 литра воды (молока, ЗЦМ) выпаивают дважды в день.

С профилактической целью концентрат используют в течение трёх дней – разводят 25 грамм концентрата на 2 л воды (молока, ЗЦМ) выпаивают дважды в день.

При появлении диареи телят нельзя давать молоко коровы и заменитель цельного молока. Используют концентрат с 1 по 3 день 2-3 раза в день по 2 литра, для этого 100 г порошка растворяют в 2 литрах теплой питьевой воды (40 °С). С 4-го дня начинают выпаивание молоком или заменителем цельного молока. Клинические признаки диареи исчезают после первых суток применения концентрата, но использовать препарат рекомендуется в течение 2-3 суток во избежание рецидива.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При применении препарата в рекомендованных количествах побочных явлений и осложнений не отмечается.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не установлены.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Особые меры предосторожности не предусмотрены. **Запрещается назначать концентрат одновременно с антибиотиками и сульфаниламидами.** Антибиотики и другие лекарственные средства можно применять не ранее чем через два часа после применения препарата GROSTART – NO DIAR.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, прохладном месте, в заводской упаковке. Срок годности – **6 месяцев**

